



KOMUNIKAT DLA MALIN

Na wielu plantacjach malin można stwierdzić dużą liczebność przędziorka chmielowca. Ciepła i wilgotna pogoda to idealne warunki do rozwoju tego szkodnika. Konieczne jest zatem przeprowadzenie lustracji i jeśli to konieczne wykonanie zabiegu akarycydem. **Można zastosować preparaty z grupy abamektyn z dodatkiem zwilżacza Wetcit w dawce 100ml/100L wody.** Trzeba pamiętać iż są to preparaty kontaktowe i skuteczność zabiegu zależy od techniki wykonania zabiegu. W obecnej fazie rozwojowej należy użyć m.in. 500l wody/ha. **W przypadku dużej liczebności szkodnika kolejny zabieg należy powtórzyć za 7-10 dni w zależności od temperatury. Ponadto preparaty z grupy abamektyny można stosować maksymalnie 2 razy w sezonie w odstępie co najmniej 28 dni.** Zatem do kolejnego zabiegu należy użyć środków o innym mechanizmie działania. Zwilżacz Wetcit w dawce 300ml/100L wody bardzo dobrze ogranicza formy ruchome szkodnika.

Duża ilość opadów w ostatnim okresie spowodowała dużą presję chorób grzybowych ; szara pleśń, rdza maliny . należy wykonać zabieg stosując preparaty np. **Switch 62,5 WG w dawce 0,8-1kg/ha , Rovral Aquaflo w dawce 1,5-2L/ha. Należy dodać zwilżacz. Do cieczy roboczej można dodać nawóz wapniowo krzemowy Mobical w dawce 1l/ha lub herbagreen Z 20 w dawce 1kg/ha/**

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów rdzy maliny należy wykonać zabieg preparatem Zato 50 jednak nie więcej niż dwa razy w sezonie.

W przypadku dużej presji mączniaka na malinie można stosować preparaty zawierające wodorowęglan potasu. Są to środki bez karencji ale łatwo zmywalne. Ograniczają w dużym stopniu choroby grzybowe. Mąga być stosowane częściej w okresie tuż przed zbiorem i w czasie zbioru