



## KOMUNIKAT DLA JABŁEK

---

W rejonach gdzie występowały duże opady deszczu loty motyli były wydłużone należy powtórzyć zabieg na owocówkę jabłkoweczkę preparatem **Madex Max w dawce 100ml/ha z dodatkiem zwilżacza Wetcit w dawce 100ml/100l wody.**

W ochronie przeciwko chorobom grzybowym można stosować preparaty **zawierające wodorowęglan potasu w dawce 5-7kg/ha z dodatkiem preparatów siarkowych (Siarkol) w dawce 2kg/ha.** Do takiej mieszaniny nie wolno dodawać żadnych nawozów, należy również użyć większej ilości cieczy.

Nadal aktualny jest komunikat dotyczący zwalczania porzewiacza jabłoniowego. Należy prowadzić systematyczną lustrację sadów. Żerowanie porzewiacza prowadzi do ordzawienia skórki owoców zwłaszcza w okolicach zagłębienia kielichowego, ponadto może być przyczyną słabego wybarwienia się owoców. Pierwszym symptomem obecności szkodnika może być skręcanie, wyginanie (łódeczkowanie) się liści. Obecnie można zastosować zwilżacz Wetcit w dawce 300ml/100l wody. Ilość wody na hektar m.in. 750litrów.

W obecnym sezonie dodatkową trudnością w zwalczaniu porzewiaczy może być silny wzrost pędów jednorocznych spowodowany mniejszą ilością owoców. Największe skupiska szkodników znajdują się pomiędzy pąkami a pędem, wokół pąków śpiących.