


System ochrony maliny przed chorobami i szkodnikami



Choroba/ Szkodnik	Środek	Dawka	rozwój pędów i liści	rozwój kwiatostanów do zasychania kwiatów	rozwój owoców do początku wybarwiania	dojrzewanie i zbiór	okres pozbiorczy i spoczynek
			BBCH 0 - 49	BBCH 67	BBCH 81	BBCH 89	BBCH 99
Szara pleśń, Mączniak prawdziwy maliny	Alginure	3-5 l/ha	2-3 zabiegi, od fazy 2 liści do intensywnego rozwoju				
	VitiSan	0,5%	prewencyjnie		prewencyjnie i interwencyjnie +WETCIT (0,2 - 0,3%)		
	PREV-B2 lub WETCIT	0,3-0,4% 0,1-0,3%	prewencyjnie i interwencyjnie, uwaga na przenawożenie borem				
Zamieranie pędów malin	Rizocore	50-100 g/ha	podlewanie lub oprysk na wybijające pędy oraz karpę korzeniową				
Przędziorki	dobroczynnek gruszożec	1000-1500 opasek/ha	aplikacja wczesną wiosną, działanie cały rok				
	WETCIT	0,1-0,3%	interwencyjnie w okresie zagrożenia, uważać na przenawożenie borem				
Mszyce, zmieniki, wciornastki	WETCIT	0,1-0,3%	interwencyjnie w okresie zagrożenia, uważać na przenawożenie borem				
Gąsienice zjadające liście	<i>Bacillus thuringiensis</i>		interwencyjnie w okresie zagrożenia, na najmłodsze gąsienice + WETCIT (0,2 - 0,3%)				
Kisłak malinowiec	białe tablice lepowe						
Pryszczarek namalinek łodygowy	pułapki feromonowe		od początku kwitnienia do zbioru				

WETCIT (0,2 - 0,3 %) - adiuwant, stosowany w połączeniu z innymi preparatami poprawia ich działanie